



Vacuna Tdap para preadolescentes y adolescentes

A todos los preadolescentes se les debería poner la vacuna Tdap a los 11 o 12 años para ayudar a protegerse contra el tétanos, la difteria y la tosferina. Hable con el médico o enfermero de su hijo si todavía no le han puesto esta vacuna.



¿Por qué mi hijo necesita la vacuna Tdap?

A los bebés y los niños pequeños se les aplica la vacuna llamada DTaP para protegerlos contra la difteria, el tétanos y la tosferina (pertussis). Sin embargo, cuando los niños crecen, la protección de estas vacunas empieza a disminuir. La vacuna Tdap ayuda a proteger a su preadolescente o adolescente contra las mismas enfermedades que la vacuna DTaP.

| Enfermedad | Síntomas y complicaciones | ¿Es grave? |
|---|--|--|
|  <p>Tétanos</p> | <ul style="list-style-type: none"> Espasmos (calambres dolorosos en los músculos de la mandíbula y el cuello o en el estómago). Problemas respiratorios. Rigidez muscular dolorosa en todo el cuerpo. | <ul style="list-style-type: none"> Sí. Los niños que contraen el tétanos podrían pasar semanas en cuidados intensivos. Hasta 1 de cada 5 personas que contraen el tétanos muere. |
|  <p>Difteria</p> | <ul style="list-style-type: none"> Recubrimiento espeso en la parte de atrás de la garganta que puede causar dificultad para respirar y tragar. Parálisis. Insuficiencia cardíaca. | <ul style="list-style-type: none"> Sí. Alrededor de 1 de cada 10 personas que contraen difteria muere como consecuencia de la enfermedad. |
|  <p>Tosferina</p> | <ul style="list-style-type: none"> Tos intensa que puede hacer difícil respirar después de los ataques de tos. Tos que puede durar por muchas semanas. Ataques violentos de tos con vómitos, que puede provocar la quebradura de costillas. | <ul style="list-style-type: none"> Sí. Puede ser grave para las personas de todas las edades, pero especialmente para los bebés, para quienes incluso puede ser mortal. La tosferina también puede causar que su hijo pierda días de escuela y otras actividades. |


¿Es la vacuna Tdap segura para mi hijo?

Investigadores han estudiado la vacuna Tdap con mucha atención y ha mostrado ser muy segura. Como cualquier otra vacuna o medicamento, la vacuna Tdap puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son leves e incluyen enrojecimiento y dolor en el brazo en donde se aplicó la inyección, dolor de cabeza, fiebre o cansancio.

Algunos adolescentes y preadolescentes podrían desmayarse después de que se les ponga la vacuna Tdap o cualquier inyección. Para ayudar a evitar los desmayos y las lesiones relacionadas, deberían sentarse o recostarse cuando les pongan una inyección y quedarse así por 15 minutos después de que se la hayan puesto. Los efectos secundarios graves de la vacuna Tdap son raros.

¿Cómo puedo obtener ayuda para pagar estas vacunas?

La mayoría de los planes de seguro médico cubren las vacunas de rutina. El Programa Vacunas para Niños (VFC) también proporciona vacunas a los niños de 18 años y menores sin seguro médico, con seguro médico insuficiente, que reúnan los requisitos para recibir Medicaid, o que sean indoamericanos o nativos de Alaska. Infórmese más en <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/parents/qa-flyer-sp.html>.



Hable con el médico o enfermero de su hijo acerca de la vacuna Tdap o visite la página <https://www.cdc.gov/pertussis/vaccines-sp.html>

